

Drug Facts

Active ingredient (%)	Purpose
Benzocaine 7.5%	Oral Anesthetic/Analgesic

Uses • For the temporary relief of occasional minor irritation, pain, sore mouth, pain associated with canker sores or pain due to minor irritation of the mouth and gums caused by dentures or orthodontic appliances.

Warnings: Do not exceed recommended dosage
METHEMOGLOBINEMIA WARNING: Use of this product may cause methemoglobinemia, a serious condition that must be treated promptly because it reduces the amount of oxygen carried in blood. This can occur even if you have used this product before. Stop use and seek immediate medical attention if you or a child in your care develops:

- pale, gray, or blue colored skin (cyanosis)
- headache • rapid heart rate • shortness of breath
- dizziness or lightheadedness • fatigue or lack of energy

Allergy alert • do not use this product if you have a history of allergy to local anesthetics such as procaine, butacaine, benzocaine, or other "caine" anesthetics.

Do not use

- for teething
- in children under 2 years of age

Consult a doctor promptly if:

sore mouth symptoms do not improve in 7 days, or if irritation, pain, or redness persists or worsens. If sore throat is severe, persists for more than 2 days, is accompanied or followed by fever, headache, rash, swelling, nausea, or vomiting.

Keep out of reach of children. In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away. **If pregnant or breastfeeding,** ask a health professional before use.

Directions

• For children over 12 years of age and Adults • Apply **Finafta® MultiOral Spray** up to 4 times daily to affected areas of the mouth, gums or mucous membranes (mouth and throat). • Allow to remain in place at least 1 minute and then spit out • Close bottle tightly after each use. • Children under 12 years of age: Do not use

Other information

- Do not accept this product if safety seal is torn, broken or missing. • Store between 15°-30°C (59°-86°F).
- Keep box for information.

Inactive ingredients

Benzalkonium chloride, glycerin, methylparaben, peppermint oil, phosphoric acid, propylene glycol, propylparaben and purified water.

Questions or comments? (305) 805-3456
Monday-Friday (9 a.m.-5 p.m.)
www.efficientlabs.com

Datos Farmacológicos

Ingrediente activo (%)	Propósito
Benzocaína 7.5	Anestésico/Analgésico Oral

Usos • Para el alivio temporal de una irritación leve ocasional, dolor, dolor en la boca, dolor asociado con aftas o dolor debido a irritación leve de la boca y las encías causada por dentaduras postizas o aparatos de ortodoncia.

Avisos: No exceder la dosis recomendada **ADVERTENCIA DE METAHEMOGLOBINEMIA:**

El uso de este producto puede causar metahemoglobinemia, una afección grave que debe tratarse con prontitud porque reduce la cantidad de oxígeno en sangre. Esto puede ocurrir incluso si ha usado este producto anteriormente. Deje de usar y busque atención médica inmediata si usted o un niño en su cuidado desarrolla:

- piel pálida, gris o azul (cianosis) • dolor de cabeza
- frecuencia cardíaca rápida • dificultad para respirar
- mareos o aturdimiento • fatiga o falta de energía

Aviso de Alergia • No utilice este producto si usted tiene una historia de alergia a los anestésicos locales tales como procaína, butacaína, benzocaína, u otros anestésicos conteniendo el ingrediente "caína". Personas con sensibilidad a la Benzocaína, no deben usar este producto.

No use

- para la dentición
- en niños menores de 2 años

Consulte a un médico de inmediato si:

Los síntomas de dolor en la boca no mejoran en 7 días, o si la irritación, el dolor o el enrojecimiento persisten o empeoran. Si el dolor de garganta es intenso, persiste durante más de 2 días, va acompañado o seguido de fiebre, dolor de cabeza, erupción cutánea, hinchazón, náuseas o vómitos.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

En caso de sobredosis, obtenga ayuda médica o comuníquese con un Centro de Control de Intoxicaciones de inmediato. **Si esta embarazada o amamantando,** consulte a un profesional de la salud antes de usar.

Instrucciones

Adultos y niños de 12 años en adelante: aplicar en el área afectada. Haga gárgaras, distribuyalo en la boca, o permita que permanezca en su lugar por lo menos 1 minuto y luego escúpalo. Use hasta 4 veces al día o en las áreas afectadas de la boca, encías o las membranas mucosas (boca y garganta). Cierre la botella herméticamente después de cada uso. • No utilice en niños menores de 12 años de edad.

Información adicional

- No acepte este producto si el sello de seguridad está roto o falta.
- Almacene entre 15°-30°(59°-86°F).
- Guarde la caja para instrucciones.

Ingredientes inactivos

Aceite de hierbabuena, ácido fosfórico, agua purificada, cloruro de benzalkonium, glicerina, metilparabeno, propilen glicol y propilparaben.

Preguntas o comentarios? (305) 805-3456
Lunes-Viernes (9 a.m.-5 p.m.)
www.efficientlabs.com