

## Drug Facts

**Active ingredient** (in each teaspoonful, 5 mL) **Purpose**  
Dextromethorphan HBr 15 mg (USP).....Cough suppressant

**Uses** • temporarily relieves cough as may occur with the common cold or inhaled irritants.

### Warnings

A persistent cough may be a sign of a serious condition.

If cough persists for more than 1 week, tends to recur, or is accompanied by fever, rash, or persistent headache, consult a doctor.

### Do not exceed recommended dosage.

**Do not use** • this product for persistent or chronic cough such as occurs with smoking, asthma, or emphysema, or if cough is accompanied by excessive phlegm (mucus) unless directed by a doctor.

• if you are now taking a prescription monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (certain drugs for depression, psychiatric, or emotional conditions, or Parkinson's disease), or for 2 weeks after stopping the MAOI drug.

• if you do not know if your prescription contains an MAOI, ask a doctor or pharmacist before taking this product.

• **Stop use and ask a doctor if** cough persists for more than 1 week, tends to recur, or is accompanied by fever, rash, or persistent headache.

**If pregnant or breast-feeding**, ask a health professional before use.

**Keep out of reach of children.** In case of an overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

### Directions

• shake well before each use. • do not exceed more than 4 doses in any 24-hour period or as directed by a doctor.

Age	Dose
adults and children 12 years and over	10 ml (2 tsps) every 6 to 8 hrs hours
children 6 to under 12 years of age	5 ml (1 tsp) every 6 to 8 hours
children under 6 years of age	consult a doctor

**Other information** • Each 5 mL contains: sodium 6 mg, and potassium 2 mg. Phenylketuronics: Contains Phenylalanine 6.75 mg per mL (teaspoonful).

**Tamper-Evident Feature:** Do not use if cap seal over cap is torn, broken or missing. • store between 15°-30° C (59°-86° F)  
Dosage cup included. Does not contain alcohol or antihistamines. Product color & flavor may vary due to natural honey.

**Inactive ingredients** Aspartame, Flavor, Honey, Methylparaben, Potassium Sorbate, Propylene Glycol, Propylparabane, Purified Water and Sodium Chloride.

**Questions or comments?** 305-805-3456  
Monday - Friday (9 AM - 5 PM EST) or www.efficientlabs.com

Other cold formulas: Cough Out®, Rompe Pecho®, Rompe Pecho® DM, Rompe Pecho® SF, Rompe Pecho® CF, Rompe Pecho® SF Flu.

Distributed by:  
**Efficient Laboratories, Inc.**  
Miami, FL 33166, Made in U.S.A.

## Datos Farmacológicos

**Ingrediente activo** (en cada cucharadita, 5 mL) **Propósito**  
Dextrometorfan HBr 15 mg (USP).....Supresor de la tos

**Uso** • alivia temporalmente la tos producida por resfriado o al inhalar algun irritante.

### Avisos

Una tos persistente puede ser una señal de una condición seria.

Si la tos persiste por mas de 1 semana, es recurrente o es acompañada con fiebre, sarpullido o un dolor de cabeza persistente, consulte a un medico.

### No exceda la dosis recomendada.

**No usar** • Este producto, si existe tos crónica comola producida por fumar, asma o enfisema, o si la tos está acompañada con mucha flema. Al menos que haya sido por el médico.

• si usted está tomado un inhibidor de monoamine oxidase (MAOI) por receta médica o ciertas drogas para las depresión psiquiátrica o emocional, o para Parkinson's, o por más de dos semanas después de haber parado el uso de droga MAOI. Si no sabe si su medicamento contiene MAOI pregúntele a su farmacéutico antes de usar este producto, al menos que haya sido indicado por su médico.

• si no sabe si su medicamento contiene MAOI, preguntele a su farmaceutico o doctor antes de tomar este producto.

• si usted tiene una enfermedad crónica pulmonar o falta de respiración no use este producto si no es indicado por su doctor.

**Descontinúe su uso y consulte a un médico si** la tos persiste por más de 1 semana, si es recurrente o está acompañada de fiebre, sarpullido o dolor de cabeza persistente.

**Si usted está embarazada o lactando** consulte a su doctor antes de tomarlo.

### Manténgalo fuera del alcance de los niños.

En caso de sobre dosis, busque asistencia médica o llame al Centro de Tratamiento por Envenenamiento inmediatamente.

### Instrucciones

• agite bien antes de usar • No exceder más de 4 dosis en un periodo de 24 horas o como lo indique un médico

Edad	Dosis
Adultos y niños mayores de 12 años	10 ml (2 cdtas) cada 6 a 8 horas
Niños de 6 a 12 años	5 ml (1 cda) cada 6 a 8 horas
Niños menores de 6 años	consulte a un médico

**Otra información** • Cada cucharadita (5 mL) contiene: 6 mg de sodio, y 2 mg de potasio. Fenilketonuricos: Fenilalanina 6.75 mg por 5 mL (cucharadita).

**Evidencia de Seguridad:** No acepte si el sello de la tapa está roto o falta. Almacene entre 15°-30° C (59°-86° F).

Copa de dosificación está incluida. No contiene alcohol o antihistamínico. La miel puede variar el color y sabor del producto.

**Ingredientes inactivos** Agua Purificada, Aspartame, Cloruro de Sodio, Metilparabeno, Miel de Abeja, Propilen Glicol, Propilparabano, Saborizante y Sorbato de Sodio.

**¿Preguntas o comentarios?** 305-805-3456  
Lunes - Viernes (9 AM - 5 PM EST) o www.efficientlabs.com

Otras fórmulas: Cough Out®, Rompe Pecho®, Rompe Pecho® DM, Rompe Pecho® SF, Rompe Pecho® CF, Rompe Pecho® SF Flu.

Distribuído por:  
**Efficient Laboratories, Inc.**  
Miami, FL 33166, Hecho en EE.UU.